

لقاحات كوفيد-19

الأمور التي يجب عليك معرفتها

إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بشأن موعدك

يُرجى الاتصال بالخط الساخن للقاحات في جامعة ولاية أوهايو على الرقم

614-688-VAXX (8299)

وحدد أحد الخيارات 1 أو 2:

الخيار 1: إذا كنت مريضًا في جامعة ولاية أوهايو وتحتاج إلى تغيير موعدك أو إلغاءه أو إذا كانت لديك أسئلة.

الخيار 2: إذا لم تكن مريضًا في جامعة ولاية أوهايو وتحتاج إلى تغيير موعدك أو إلغاءه أو إذا كانت لديك أسئلة.

هل تحتاج إلى توصيلة للحصول على لقاحك؟

للحصول على قائمة بخيارات التوصيل إلى موعد التطعيم التالي:

يُرجى الاتصال على الرقم

614-688-8299، الخيار 4 أو تفضل

بزيارة go.osu.edu/freeride.

ويمكنك أيضًا الاتصال على الرقم

614-525-6200. اترك رسالة

وسيتصل بك أحد أعضاء الفريق لمساعدتك في ترتيب التوصيل وتحديد مواعيدك.

لقاحات كوفيد-19 آمنة وفعالة. يُرجى قراءة هذه المعلومات لمعرفة المزيد. يمكنك التحدث إلى الطبيب أو الممرضة أو الصيدلي إذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف.

الحصول على اللقاح في جامعة ولاية أوهايو

سيتم إعطاؤك ورقة معلومات حول اللقاح الذي ستحصل عليه وبطاقة اللقاح. وسيتم إعطاء هذا اللقاح في صورة حقنة باستخدام إبرة تُحقن في عضلة الذراع العليا.

إذا شعرت أنك لست على ما يرام، أو إذا ارتفعت درجة حرارتك حتى 100 درجة فهرنهايت أو أكثر، فيجب عليك الانتظار حتى تتحسن حالتك قبل الحصول على اللقاح.

ضع في اعتبارك أن الموعد سيستغرق حوالي ساعة واحدة. سيتعين عليك الانتظار لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة بعد الحصول على الحقنة حتى تتأكد الممرضة من عدم إصابتك بأية رد فعل تحسّسي.

قد يكون لقاحك جرعة واحدة أو جرعتين. قد يُنصح أيضًا بالحصول على جرعة ثالثة أو معززة.

الآثار الجانبية

لا تحتوي اللقاحات على أي فيروس حي، ولذلك لا يمكن أن تُصاب بكوفيد-19 نتيجة حصولك على اللقاح. كما أنك لن تصيب الآخرين بعدوى كوفيد-19 بحصولك على اللقاح.

حيث إن اللقاحات تُعلم الجهاز المناعي في جسمك كيفية التعرف على فيروس كوفيد-19 ومكافحته، فقد تكون هناك بعض العلامات الدالة على فعالية عمل اللقاح.

قد تشمل الآثار الجانبية:

- القشعريرة أو ارتفاع درجة الحرارة (الحمى)
- الشعور بالإرهاق
- آلام العضلات والمفاصل
- الصداع

قد تظهر الآثار الجانبية في اليوم التالي وتستمر لمدة يوم إلى يومين.

لمعرفة المزيد

- go.osu.edu/COVIDVaccine
- cdc.gov/coronavirus
- coronavirus.ohio.gov
- الخط الساخن لوزارة الصحة بولاية أوهايو:
1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634)

ما الذي يمكننا تحسينه؟

بينما يقوم جسمك ببناء الحماية، يُرجى مساعدتنا على الاستمرار في تحسين تجربة التطعيم لمرضانا من خلال ترك ملاحظتك حول الموقع الذي حصلت فيه على اللقاح. وستحتاج إلى امتلاك حساب على Google للقيام بذلك.

go.osu.edu/shotreview



تفاعلات حساسية معتادة في موضع

الحقن

تتضمن أكثر الآثار الجانبية شيوعًا والتي تحدث في موضع حقن اللقاح الألم أو الاحمرار أو التورم. وغالبًا ما تتحسن خلال أول يومين بعدها. وقد تعود الإصابة بالاحمرار والتورم مرة أخرى لدى بعض الأشخاص بعد أسبوع، ولكن من المفترض أن يزول أي احمرار أو تورم بعد أسبوعين من الحصول على اللقاح.

إذا ظهر لديك رد فعل تحسسي في موضع الحقن لأكثر من أسبوعين، أو كانت لديك أسئلة أخرى حول الآثار الجانبية، فيرجى الاتصال بطبيب الرعاية الأولية الذي تتعامل معه.

الحماية التي يوفرها اللقاح

سيتم الوصول إلى أقصى قدر من الحماية بعد أسبوعين من تناولك للجرعة الأولى أو بعد أسبوعين من الجرعة الثانية من اللقاحات ذات الجرعتين.

قد يُوصى بجرعة إضافية من اللقاح لك. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الذي تتعامل معه لمزيد من المعلومات.

ينبغي الاحتفاظ ببطاقة اللقاح التي ستحصل عليها اليوم.