

COVID-19疫苗

疫苗接种注意事项



COVID-19 疫苗安全有效。请阅读此信息以了解详情。如有疑问或担心，请咨询医生、护士或药剂师。

在俄亥俄州立大学接种疫苗

您将获得一份有关接种疫苗的信息表和一张疫苗卡。疫苗的接种方式是通过注射器注入上臂肌肉。

如果您身体不适，或者出现体温100华氏度（约37.8摄氏度）或更高的发热现象，请在症状好转后再接种疫苗。

请为接种疫苗的整个过程留出大约1小时。您在注射疫苗后需现场等待15至30分钟，以便护士检查是否出现任何反应。

您接种的疫苗可能是1或2针剂。您可能需要接种第三针疫苗或加强针。

副作用

疫苗 **不含任何活病毒**，因此您不会因注射疫苗而感染COVID-19。您也不会因接种疫苗而将COVID-19传染给其他任何人。

疫苗会“教”免疫系统如何识别和抵抗COVID-19病毒，因此您可能会出现一些显示疫苗开始生效的迹象。

副作用可能包括：

- 发热或寒战
- 肌肉痛和关节痛
- 头痛
- 疲劳
- 恶心、呕吐或腹泻

副作用可能会在第二天出现，持续1至2天。

如需咨询预约

请致电俄亥俄州疫苗热线
614-688-VAXX (8299)，选择
选项1或2：

选项1：您是俄亥俄州立大学的学生，需要更改或取消预约或对预约有疑问。

选项2：您不是俄亥俄州立大学的学生，需要更改或取消预约或对预约有疑问。

疫苗接种接送服务？

如需了解预约下一次疫苗接种的接送方案清单：

致电 **614-688-8299**，**选项4**
或访问 go.osu.edu/freeride。

您也可以致电
614-525-6200。您留言后，
我们的团队成员将给您回电，
帮助您查找并安排接送车辆。



THE OHIO STATE UNIVERSITY

WEXNER MEDICAL CENTER

wexnermedical.osu.edu

接种部位常见反应

疫苗接种部位最常见的副作用包括：疼痛、肿胀或发红。这些反应通常在2天后有所改善。部分接种者会在一周后再次出现红肿反应，但所有红肿反应都应在接种疫苗后2周内消失。

如果您的接种部位出现反应超过2周，或者您对副作用有其他疑问，请联系您的初级保健医生。

疫苗保护

接种一剂疫苗，您将在接种后2周获得最大保护；接种两剂疫苗，您将在第二剂疫苗接种后2周获得最大保护。

可能建议您加打一剂疫苗。请咨询您的医疗服务提供方了解更多信息。

请保留今日拿到的疫苗卡。

了解更多

- go.osu.edu/COVIDVaccine
- cdc.gov/coronavirus
- coronavirus.ohio.gov
- 俄亥俄州卫生部热线：
1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634)

疫苗接种体验改善？

在您的身体建立保护的同时，请留下有关您疫苗接种地点的评论，以帮助我们继续改善患者的疫苗接种体验。为此，您需要一个谷歌账号。

go.osu.edu/shotreview

